

خمس حالات ترتفع فيها خطورة الإصابة

الحالة الثانية الأكل والشرب مع عدد كبير من الناس ولمدة طويلة

خطورة الإصابة عند استضافة الناس مع الأكل والشرب لوقت طويل أكبر من العشاء أو الغداء السريعين.

ترتفع خطورة الإصابة في مناسبات الأكل التي تتضمن أكثر من 5 من الحضور حيث يتحدثون بصوت عال فتتطاير قطرات الرذاذ بينهم.



الحالة الأولى لقاء مع الشرب

عندما يشرب المرء بفرح ولكن يضعف انتباذه وسمعه فيرتفع صوته.

ترتفع خطورة الإصابة عندما يبقى عدد كبير من الناس وقتا طويلا في مكان ضيق محاط بالقواطع والفوائل.

ترتفع خطورة الإصابة عندما يتشارك الناس في استخدام أدوات المائدة.



الحالة الخامسة الانتقال من مكان إلى آخر

عند الانتقال من مكتبك في مكان العمل إلى غرفة الاستراحة مثلًا قد ترتفع خطورة الإصابة بسبب الاسترخاء أو التغير في البيئة المحيطة.

هناك حالات اشتباه في إصابات في غرفة الاستراحة وغرفة التدخين وغرفة الملابس.



الحالة الرابعة الحياة الجماعية في مكان ضيق

ترتفع خطورة الإصابة عندما يتشارك الناس في مكانا مغلقا لمدة طويلة في حياة جماعية بمكان ضيق.

هناك تقارير تفيد الاشتباه في إصابات في الأماكن المشتركة مثل غرفة المسكن والحمامات.



الحالة الثالثة التحدث بدون قناع

ترتفع خطورة الإصابة أثناء الحوار من مسافة قريبة بدون قناع عن طريق عدوى قطرات الرذاذ وال قطرات الدقيقة.

هناك حالات إصابة مثلًا عند استخدام الكاريوكى بوكس في النهار بدون قناع.

بحاجة إلى الانتباه داخل الباصات والسيارات عند التنقل.

