

ห้ามการณ์ที่เพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อ

จาก (1) การสังสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการดื่ม ฯลฯ

- ผลของการดื่มทำให้คุณรู้สึกอารมณ์เลี้ยงและตื่นตัวขึ้นอย่างในเวลาเดียวกัน พากขยาย้มีการได้ยินที่น่าเบื่อและมักจะพูดเสียงดัง
- ความเสี่ยงของการติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นเมื่อผู้คนจำนวนมากอยู่เป็นเวลานานในพื้นที่เล็ก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขากลุ่มคั่นด้วยเกลน์
- นอกจากนี้การแบ่งปันเครื่องดื่ม และตะเกียงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ



จาก (2) รับประทานและดื่มเป็นกลุ่ม ใหญ่และเวลานาน

- การกินและดื่มเป็นเวลานานการกินและดื่มด้วยความบันเทิงและการดื่มแบบขั้นบันไดตอนตีกจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเมื่อเทียบกับอาหารมื้อสั้น ๆ
- การกินและดื่มเป็นกลุ่ม ใหญ่ เช่น ห้าคนขึ้นไปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนื่องจากเสียงดังและละของน้ำที่กระเด็นได้ง่าย



จาก (3) การสนทนากลุ่มโดยไม่มีหน้ากาก

- การพูดคุยในระยะใกล้โดยไม่มีหน้ากากจะเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อผ่านหูด้านในและไม่โครสเพรย์。
- พูดกรณีของการติดเชื้อโดยไม่มีหน้ากากในครา โอะเกะ สำหรับมือกลางวัน
- ระมัดระวังในรถหรือรถประจำทางเมื่อเดินทางโดยรถยนต์หรือรถประจำทาง



จาก (4) ออยู่ร่วมกันในพื้นที่เล็ก ๆ

- การอยู่ร่วมกันในพื้นที่ขนาดเล็กจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนื่องจากมีการใช้พื้นที่ร่วมกันเป็นเวลานาน
- มีรายงานผู้ต้องสงสัยติดเชื้อในพื้นที่ล้วนกลาง เช่นห้องพักรวมและห้องน้ำ



จาก (5) การเปลี่ยนสถานที่

- เมื่อคุณเปลี่ยนสถานที่ เช่น เมื่อคุณหยุดพักจากการเดินทางในการติดเชื้อจากเพิ่มขึ้นเนื่องจากความหย่อนยาน หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
- มีการยืนยันกรณีที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อในห้องพักพื้นที่สูบบุหรี่และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

