

令和8年度 定期の予防接種

予防接種は重篤な感染症からお子さんを守るものです。感染症に対する免疫をつけるために、ウイルスや菌・毒素の力を弱めてワクチンを作り体に接種するので、必ず健康な時に接種してください。また、「**予防接種と子どもの健康**」等を読み、**ワクチンについて理解した上で接種してください。**

- 自己負担金 なし（対象年齢の子ども）
- 持ち物 母子健康手帳
予診票、健康保険証
子ども医療費受給者証
委託医療機関（裏面）
- 実施場所

2026年3月作成


6週 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月 8ヵ月 1歳 2歳 3歳 5歳未満 7歳 9歳 11歳 13歳未満 16歳

ロタウイルス感染症 1価(ロタリクス) 生後24週0日まで 5価(ロタテック) 生後32週0日まで	経口生ワクチン	1価 ① ② 5価 ① ② ③ *1価または5価を選択 初回接種は14週6日までに接種(27日以上の間隔を置いて1価は2回接種、5価は3回接種)
B型肝炎 生後12月(1歳になる前日)まで	不活化ワクチン	① ② ③ 初回:27日以上の間隔を置いて2回接種 3回目は1回目の接種から139日以上の間隔を置いて1回接種
小児用肺炎球菌 ※注1 (15・20価ワクチン) 生後2か月から生後60月	不活化ワクチン	① ② ③ ④ ※注1 初回:生後12月までに27日以上の間隔で3回接種 追加:3回目の接種から60日以上あけ、生後12月～15月に1回接種
五種混合 ※注2 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ヒブ・ポリオ) 生後2か月から生後90月	不活化ワクチン	① ② ③ ④ ⑤ 初回:20日以上の間隔で3回接種 追加:初回3回目終了後6月～18月までの間隔を置いて1回接種 2期 ⑤ 二種混合を1回接種(11歳以上13歳未満) (ジフテリア・破傷風)
BCG 生後12月(1歳になる前日)まで	生ワクチン	① 1回接種
麻しん・風しん(MR) 1期:生後12月から生後24月(2歳になる前日)まで 2期:小学校就学前の1年間(年長)	生ワクチン	1期 ① 1回接種 2期 ② 小学校就学前の1年間(年長児)に1回接種
水痘 ※注3 生後12月から36月(3歳になる前日)まで	生ワクチン	1期 ① ② 1回目を接種後6～12か月あけて2回目を接種
日本脳炎 ※注4 1期:生後6月から生後90月 2期:9歳以上13歳未満	不活化ワクチン	① ② ③ ④ ◆静岡県は豚の日本脳炎感染状況が高い地域であるため、生後6か月からの早期接種を推奨しています。 初回:6日以上の間隔で2回接種 1期完了者1回接種(9歳以上13歳未満) 追加:2回接種後、6か月以上(おおむね1年)あけて1回接種
子宮頸がんワクチン※注5 9価のみ 小学校6年生から高校1年生(女性)	不活化ワクチン	① ② ③ 標準的接種間隔 2回目:1回目から2月の間隔をあけて接種 3回目:1回目から6月の間隔をあけて接種

- ※ 注1 接種開始の月齢により接種回数が異なります。
開始時生後7月から1歳未満の場合は、27日以上の間隔で2回接種し、初回接種終了後60日以上あけ、1歳のお誕生日以降に1回接種、
生後1歳から2歳未満の場合は60日以上の間隔をあけて2回接種、生後2歳以上5歳未満は1回接種する。★15価と20価のワクチンがあります。原則、20価ワクチンを4回接種します。
- ※ 注2 混合接種は、原則、初回接種と同じワクチンで接種を完了してください。四種混合ワクチンの製造停止により五種混合ワクチンを接種することは差し支えありません。接種間隔にご注意の上、接種してください。
- ※ 注3 既に水痘にかかったことのある人は定期予防接種の対象外です。
- ※ 注4 日本脳炎の予防接種は特別措置があります。…平成19年4月1日生まれまでのお子さんは、1期及び2期の未接種分を20歳のお誕生日の前日まで定期として接種可能です。
- ※ 注5 原則3回接種ですが、初回を9価のワクチンかつ15歳未満で接種した場合は、1～2回目を6月以上あければ2回接種で完了とすることができます。



他の予防接種を受ける間隔



【問合せ先】 焼津市健康づくり課(保健センター)
TEL 054-627-4111
FAX 054-627-9960