

焼津市子宮頸ガン予防ワクチン接種後の状況調査 集計

※設問項目(問5)接種後の体調の変化「その他」の記載内容

すごく腫れた訳でもなかったが筋肉痛(軽い)のようになり、重くなったような鈍い感じがした。だが、生活には支障はあまりなかった。
今まで接種した予防ワクチンの中で一番不快感を訴えていました。周りの友達もそのような傾向でした。
ふつうにしていれば大丈夫ですが、手に当たったり、さわられたりすると痛みがありました。
強い腹痛。
3日ぐらいで痛みはひいたが、手が上がりにくく、痛みが強かった。
接種後にあざができた。
3回接種後顔面蒼白、吐き気出現。クリニックで処置。
翌日腹痛により学校早退(原因は不明)。
接種後すぐ顔面蒼白。気分不快。
腹痛(下腹部)。
接種した腕がだるい、重い。
とにかく痛み等があったのは覚えているが、発熱等は忘れてしまった。
手足のしびれと震え、過眠症、胸の痛み、呼吸困難、視力低下、ひどい生理痛、腹痛。
腕の重み。
他(の予防接種)に比べて痛みを強く感じた。
部位の腫れですが、一度、呼吸がしにくくなり、苦しくなったと言っていました。
受験の年でテストも多かったため、1度目にすごく痛って1週間くらい腕が上がらなかったのも、2回目以降はテストがない時を選んだ。
1回目の接種翌日、(運動部の)大会で熱中症と言われ入院。なかなか元の体調に戻らず部活もろくにできませんでした。病院で、このワクチンの影響ではと話しましたが、「違う」と言われ、娘は半年ほど体調不良が続きました。2回目の接種後も同様でした。
接種部位の痛み・かゆみ、筋肉痛、腕が上がらない症状が接種当日から3日間位ありました。
他の予防接種の時は部位の痛み、かゆみなどがあるが、特に手足の痛みが強く学校生活に支障が出た。4年以上経過してしまっているのも、本人の記憶も薄れている。
身体中の関節が痛くなり、ひどい時は足に力が入らない感覚がしました。今は何ともありません。
手のけいれん。
腕が上がらない程ではなかったが、重く感じた。
じんま疹。
貧血時のような症状があり、目の前が暗くなった。
今でも、接種部位に傷跡のようなものが残っています。
接種側のウデ全体が、しびれというか、冷たくなってしまい、その後硬直状態でとても心配でした。

接種が原因かわからないのですが、眠気や頭痛などがあった。
1回目の接種後2日間、しびれが有った(接種した方の腕の肩から指先まで)。
軽度の痛み・かゆみ。
他の予防接種に比べて腫れが大きかった。
注射の後が、かなり痛み、腕が何日かひどく重くとてもだるかった。
注射した腕を上にあげる事が大変だった(1週間位)。
主に軽い筋肉痛。
右腕を注射した時に、文字を書くにも痛くて塾を休んだことを思い出しました。
予防接種と関係ないかもしれません。
腹痛、顔が青白くなり動けなくなる。
接種部が熱くなった。
不随意運動(全身) 呼吸障害 睡眠障害。